

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 28-4-71 178076

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

PUBLICATION PERIODIQUE

EDITION DE LA STATION DU LANGUEDOC

(Tél. 92.28.72)

(AUDE, GARD, HERAULT, LOZERE, PYRENEES-ORIENTALES)

Régisseur de recettes, Direction Départementale de l'Agriculture, Maison de l'Agriculture - Bât. 5 - Place Chaptal

34 MONTPELLIER

C.C.P. MONTPELLIER 5.238-57

Abonnement Annuel

25 FR<sup>ancs</sup>

N° I27 - Avril 1971

4<sup>o</sup> supplément

## CULTURES MARAICHÈRES

### ASPERGES

#### ROUILLE DE L'ASPERGE

Les premières attaques de rouille, stade oecidien, ont été observées à la base des jeunes turions d'asperges encore improductives.

Si les conditions climatiques actuelles se maintenaient (rosées matinales persistantes) ces taches peu visibles et qui passent souvent inaperçues pourraient déclencher d'ici 2 semaines environ les premières attaques de rouille, bien repérables celles-là sur les ramifications aériennes (pustules brun-rougeâtre, sous épidermiques).

Les traitements préventifs doivent donc être mis en place dès à présent dans les jeunes aspergières non récoltées. Ils devront assurer une protection permanente des jeunes pousses de façon à prévenir les attaques de rouille qui peuvent se renouveler tous les 10 à 12 jours en période favorable au développement et à l'extension de la maladie.

On utilisera un fongicide de synthèse (Manèbe, Mancozèbe, Ferbame, Thiocyanodinitrobenzène, Propinèbe, etc...) aux doses préconisées par les fabricants. Il est recommandé d'ajouter un bon mouillant à la bouillie.

Si l'on constate la présence de Criocères (ces derniers ont déjà fait leur apparition), pulvériser une bouillie mixte contenant en plus du fongicide un des insecticides suivants :  
Lindane 20 g/hl - Parathion 30 g/hl.

#### MOUCHE DE L'ASPERGE

Toujours dans les jeunes plantations en voie d'établissement et sujettes aux attaques de la Mouche il sera utile d'ajouter au fongicide anti-rouille un des produits recommandés dans l'édition spéciale n° I26 de mars 1971 et que nous rappelons à toutes fins utiles : Diazinon 30 g - Diméthoate 30 g - Endothion 50 g - Formothion 50 g de MA/hl.

#### DESHERBAGE DES ASPERGES

En cours de récolte dès que les mauvaises herbes prennent un développement exagéré entraînant une gêne à la cueillette, l'utilisation du Paraquat (aux doses recommandées par les fabricants) permettra ce désherbage sur les buttes.

Le mélange Diquat + Paraquat peut être également utilisé.

Le traitement ne devra être exécuté qu'en l'absence de turions hors de terre, c'est-à-dire de suite après une récolte totale des asperges visibles.

Ces herbicides de contact auront leur maximum d'efficacité s'ils sont utilisés par temps couvert ou de préférence en fin de journée.

Sans rémanence, soit qu'ils exterminent les dicotylédones et graminées annuelles, soit qu'ils dessèchent les organes aériens de nombreuses espèces vivaces, ces herbicides "nettoient" les buttes et facilitent la récolte.

## PUCERONS SUR TOUTES CULTURES

Contre les pucerons qui se manifestent sur toutes les cultures maraîchères, utiliser un des produits recommandés dans l'édition spéciale n° I26 de mars 1971, à l'exclusion de toutes autres matières actives non autorisées.

## POMMIERS - POIRIERS

Les premières taches de Tavelure sont observées. Les prochaines précipitations provoqueront des contaminations qui seront très importantes. Il convient donc d'effectuer un traitement fongicide dans les plus brefs délais. Un tel traitement doit être appliqué aussi dans les vergers où les taches ne sont pas observées, car les risques de contamination par ascospores (à partir des feuilles tombées en 1970) demeurent.

M. BEZUT

L'Inspecteur de la Protection des Végétaux : P. BERVILLE

-----  
Ministère de l'Agriculture  
STATION REGIONALE D'AVERTISSEMENTS VITICOLES

Montpellier le 23 avril 1971

-----  
Ecole Nationale Supérieure Agronomique de  
MONTPELLIER

N O T E : 1

### VERS DE LA GRAPPE -

Les premiers papillons d'eudémis ont été capturés en Pyrénées-Orientales (Baixas, St Jean Lasseille, Espira de l'Agly), et des pontes observées dans les vignes placées à bonne exposition ; quelques papillons de cochylis ont également été pris en Costières (Gallician-Gard).

Bien que retardées par les mauvaises conditions atmosphériques, les éclosions correspondantes se produiront dans les derniers jours du mois d'avril ; dans les situations les plus avancées elles pourraient être contrôlées par l'exécution préventive d'une pulvérisation à base de Carbaryl ou d'un composé phosphoré à durée d'efficacité assez longue.

### MILDIOU -

Les pluies actuelles continuent à détrempor le sol ; de larges flaques d'eau existent encore dans beaucoup de vignobles ; la longueur des pousses permet déjà d'estimer l'importance de la "sortie".

On ne saurait trop recommander, à défaut d'un traitement direct des grappes, parfois nettement détachées, de procéder à l'enlèvement soigné des organes verts inutiles situés au pied des souches établies dans les parcelles humides.

Le Directeur de la Station Régionale  
d'Avertissements Viticoles

G. BERNON

Tirage du 26 avril 1971 : 2680 exemplaires

Précédent bulletin 3° supplément du n° 127 en date du 21 avril.